



CMV Suisse

La voix de l'invisible

L'association :

Nous sommes Alexandra, Noémie et Roxane, trois mères de Suisse romande qui ont été confrontées, pendant leur grossesse, au cytomégalovirus (CMV) — un virus largement méconnu et pourtant responsable de nombreuses infections congénitales chaque année en Suisse.

Face au manque d'information, nous avons choisi de transformer notre épreuve en action. Ainsi est née CMV Suisse – La voix de l'invisible, une association dédiée à informer, sensibiliser et accompagner les futurs et jeunes parents, ainsi qu'à promouvoir une prévention simple et accessible.



CMV Suisse
La voix de l'invisible



Qu'est-ce que le CMV?


Contact :



info@cmv-suisse.ch



www.cmv-suisse.ch



cmv-suisse.ch

Le cytomégalo­virus (CMV) :

Le Cytomégalo­virus (CMV) est un virus très répandu, appartenant à la famille des virus de l'herpès. Chez l'adulte et l'enfant en bonne santé, l'infection passe souvent inaperçue : quelques symptômes grippaux ou un léger malaise. En revanche, le CMV peut être dangereux pour :

- Les femmes enceintes, car il peut se transmettre au fœtus (on parle alors de CMV congénital)
- Les personnes immunodéprimées (transplantés, patients sous chimiothérapie, personnes vivant avec le VIH)

Le CMV congénital en faits et chiffres :

- Lorsqu'une femme enceinte contracte le CMV pour la première fois (primo-infection), le virus peut traverser le placenta et infecter le fœtus. Une primo-infection peut être dangereuse dès deux mois avant la conception jusqu'à la fin du premier trimestre de grossesse, car c'est à ce moment que les organes du bébé se développent.
- Environ 1 % des femmes enceintes sont concernées.
- Lorsqu'une femme enceinte a été testée positive au CMV, il existe un risque d'environ 30% de transmission du virus au fœtus.
- Parmi les bébés touchés, environ 10 % naissent avec des séquelles graves (surdit , retards moteurs, troubles du d veloppement).
- Une majorit  de nouveau-n s n'a cependant ni sympt me apparent ni s qu lle   long terme, d'o  l'importance du d pistage et du suivi.

Le CMV en chiffres:

*sources d' tudes cliniques et hospitali res suisses de 2024



400
nouveaux-n s
infect s par an



0,5-1%
primo-infections chez
les femmes enceintes



45
d veloppent des sympt mes d s la naissance



10%
des cas entraînent des
s qu lles graves (IMG)



D pistage :

Avant ou en d but de grossesse : un bilan s rologique CMV permet de savoir si la m re a d j  contract  le virus ou non.

En cas de primo-infection, juste avant ou pendant le premier trimestre de grossesse : une amniocent se est propos e afin de d celer une  ventuelle transmission au b b . En cas de r sultat n gatif, la grossesse peut  tre poursuivie normalement.

En cas de r sultat positif, un suivi particulier sera pr conis , comprenant un traitement au Valaciclovir, des  chographies cibl es mensuelles, une cordocent se (prise de sang du cordon ombilical) et une IRM. Le Valaciclovir est un traitement antiviral permettant de stopper le d veloppement du virus. Le suivi permet quant   lui de conna tre de degr  d'infection du f tus et de prendre les d cisions n cessaires. Ces rendez-vous sont tr s stressants, n'h sitez pas   nous contacter pour  changer!

* Les informations de CMV Suisse ne remplacent pas un avis m dical. Suivez toujours les recommandations de votre m decin.

Transmission :

Le CMV se transmet principalement par contact direct avec des liquides biologiques : salive, urine et s cr tions g nitales, lait maternel, transfusion sanguine ou greffe d'organe (dans de rares cas). Les jeunes enfants gard s en collectivit  (cr che ou jardin d'enfants) sont de fr quents porteurs sains.

Gestes barri res :



Ne pas
partager



 viter
les bisous
sur la bouche



Se laver
les mains
r guli rement



Nettoyer les
objets et
jouets



Utiliser
des mouchoirs
jetables

Ensemble, faisons entendre la voix de l'invisible.